

Campanula rapunculus - Rapinchos

Descripción Herbácea bienal, con una envergadura de hasta 180 cm. Los tallos son erectos, y pueden tener pequeños pelos en su base. Las hojas basales son espatuladas, enteras o ligeramente dentadas. Las hojas caulinares disminuyen gradualmente de tamaño hacia el ápice y son lanceoladas. La floración ocurre de abril a julio, con flores en racimo, de color azul claro y con forma de embudo.

Hábitat Claros y orlas de encinares, taludes, herbazales o roquedos.

Localización Abundante en todo el término, sobre todo en los bordes de caminos. Fácilmente identificable por sus flores en los meses de junio, a lo largo de *El Camino Viejo de Carbajales*.



Dianthus lusitanus - Clavelina portuguesa

Descripción Hierba con base leñosa y tallos rígidos, de hasta 40 cm, crece en forma de mata. Las hojas son acanaladas y de color verde claro azulado. La floración se extiende de abril hasta diciembre, con flores solitarias o por pares en los extremos de las ramas. Las flores son de color rosa, con cinco pétalos dentados y 10 estambres

Hábitat Grietas o afloramientos rocosos, donde los sustratos son escasos.

Localización Aparece de manera aislada en las diferentes peñas del término. Sin ser muy abundante, es fácil observarla cuando está en flor.



Asphodelus sp. - Gamoneto

Descripción Hierba perenne con rizomas, de hasta 1,5 m de altura. Tallos erectos, simples o algo ramificados. Hojas basales lineares y planas. Florece entre marzo y abril, con las flores agrupadas en racimos simples o compuestos, en la parte superior. Las flores, blanquecinas y con un nervio medio de color marrón oscuro/negro, están formadas por 6 tépalos soldados en la base. Presentan también 6 estambres libres.

Hábitat Ampliamente extendida independientemente del sustrato, desde pastizales, matorrales o claros de bosque .

Localización Fácil de observar en todo el término, desde *El Rodillón*, hasta *La Dehesa*.



Digitalis sp. - Chupamieles

Descripción Hierba bienal o perenne, de hasta 1,5 m de altura. Tallos erectos verdes o púrpura. Hojas alternas. Florece de abril a agosto. Flores numerosas, dispuestas en racimo, con forma tubular. La especie más común es *D. purpurea*, con flores de color rosa-púrpura y puntos purpurá sobre fondo blanco en la parte inferior de la flor. Puede confundirse con *D. thapsi*, con flores generalmente algo más claras. Las flores se denominan actinomorfas porque solamente tienen un plano de simetría bilateral, es decir, solamente pueden dividirse en dos partes iguales (ver abajo).

Hábitat Crece en bordes de caminos y claros de matorrales, sobre todo en terrenos silíceos (pizarras, cuarcitas y granitos)

Localización Distribuida a lo largo de los diferentes caminos



Referencias bibliográficas utilizadas

- Vicente, M. S., Sánchez, L. D., Hernández, P. B., & Alonso, C. S. (2006). *Guía de las plantas silvestres de los Arribes del Duero zamoranos y su entorno*. Aderisa.
- Castroviejo, S. (coord. gen.). 1986-2012. *Flora iberica* 1-8, 10-15, 17-18, 21. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.